

- Algunas vacunas pueden producir reacciones.
- Estas manifestaciones son de corta duración.
- Suelen aparecer a las pocas horas o hasta 10 días después de su administración.
- Se puede producir aumento de volumen y enrojecimiento en el sitio de punción, además de fiebre y malestar general.
- En el caso de la vacuna Trisvírica, puede presentarse una leve erupción dérmica tipo Sarampión o Rubéola.

**Recomendaciones:**

Dar a tomar bastante líquido - En caso de fiebre sobre 38° dar antipirético indicado por su médico - Colocar compresas frías si existe dolor local.

**Programa de vacunación**

	RN	2 meses	4 meses	6 meses	12 meses	18 meses	4 años	Básico 1°	Básico 2°
BCG	11/06	18 DIC 2006							
DPT			20 FEB 2007						
Antipolio				00 MAYO 2007					
HIB					17 NOV. 2007				
Hepatitis B									
Trisvírica									
Toxoides DT									

Para los niños nacidos en Clínica Alemana, la colocación de las vacunas del Programa Nacional y las adicionales indicadas por su pediatra, son sin costo, durante el primer año de vida.

**Vacunas**

	Enfermedad que previene	Edad de administración
BCG	Tuberculosis	Recién Nacido
DPT	Difteria Tétano Coqueluche	2, 4, 6, 18 meses y 4 años
Antipolio	Parálisis Infantil	2, 4, 6 y 18 meses
HIB	Infecciones por Haemophilus Influenzae Tipo B	2, 4 y 6 meses
Hepatitis B	Hepatitis B	2, 4 y 6 meses
Trisvírica	Sarampión Paperas Rubéola	12 meses y 1° Básico
Toxoides DT	Difteria Tétano	2° Básico

**Vacunación Antitetánica**

1ª dosis  
Fecha \_\_\_\_\_  
Firma y Timbre \_\_\_\_\_

2ª dosis  
Fecha \_\_\_\_\_  
Firma y Timbre \_\_\_\_\_

3ª dosis  
Fecha \_\_\_\_\_  
Firma y Timbre \_\_\_\_\_

VACUNA POST EXPOSICIÓN. El esquema completo de vacunación otorga inmunidad por 10 años.

